



Commune / Lieu: Le Mouret	Plac.tém.: No. 2	Date: 10.06.2011	Auteur: Y. Wiedmer/ M. Berger
Histoire du peuplement: Dernière intervention sylvicole il y a plus de 30 ans. Quelques chablis Lothar. Quelques tiges bostrychées ont été sorties suite à Lothar	Surface du sol: Dans les creux, beaucoup de végétation au sol, sur les bosses, peu de végétation au sol	Végétation: Espèces essentielles (aspect visuel) Recouvrem. en 1/10 Hylocomium splendens 0.7 Polygonatum verticillatum 0.1 Vaccinium myrtillus (sur les bosses) 0.1 Carex sylvatica 0.1 Dryopteris filix-mas Athyrium filix-femina Autres espèces: Phyteuma spicatum Hieracium sp. Luzula sylvatica	
Atteintes / pollution: Beaucoup de chevreuils, rajeunissement fortement abrouti	Partie supérieure du sol: 	Rajeunissement: hê bien représenté ér's et frêne abroutis, que peu d'individus arrivent à dépasser le stade critique pour l'abrutissement.	
Dégâts: Environ 3/4 des épiceas sont pourris Des feux de branches dans les années 1980 ont causé de nombreux dégâts sur la partie inférieure des troncs d'épicéas.	Partie inférieure du sol: alternance de creux et de bosses avec une saturation en eau variant en fonction de cette topographie. Creux saturés en eau, bosses pas saturées	Volume sur pied, accroissement, produits d'éclaircie: En 2011: 659 sv/ha (en 2003: 602 sv/ha) (Inventaire en annexe)	
		Stade de développement / type de structure: Moyenne futaie	