

| Commune / Lieu: Albeuve, La Cuvignette | | Plac.tém.: No. FR62 | Date: 17.08.2000 | Auteur: J.C. Favre | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|----------------------------------|------------------|---|-------|------------------------|-----------|-----------|-----------|---------------------|---|-------|----|--------------------|-----|-------|-----|-------------------|------|----------|----------|---------------------------|--------|-----------|--------|-----------|------|-----------|------|----------|----|----------|-----|----------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|
| Histoire du peuplement: | | Surface du sol: | | Végétation: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Recouvr. total 3/10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Especies essentielles (aspect visuel) Recouvrem. en 1/10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Galium odoratum | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Mercurialis perennis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Paris quadrifolia | | Lonicera xylosteum | | Polygonatum verticillatum | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dryopteris filix-mas | | Autres espèces: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Atteintes / pollution: | | Partie supérieure du sol: | | Rajeunissement: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aucun dégâts de gibier, car suffisamment de nourriture dans les pâturages voisins | | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Caractéristique recrû:</th> <th>Hê (rec.)</th> <th>Hê (raj.)</th> <th>Ep (raj.)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Degré de fermeture:</td> <td>e</td> <td>e</td> <td>e</td> </tr> <tr> <td>Hauteur dominante:</td> <td>0.1</td> <td>0.7</td> <td>0.7</td> </tr> <tr> <td>Pousse terminale:</td> <td></td> <td>t. ombre</td> <td>t. ombre</td> </tr> <tr> <td>Concurrence de la végét.:</td> <td>faible</td> <td>faible</td> <td>faible</td> </tr> </tbody> </table> | | Caractéristique recrû: | Hê (rec.) | Hê (raj.) | Ep (raj.) | Degré de fermeture: | e | e | e | Hauteur dominante: | 0.1 | 0.7 | 0.7 | Pousse terminale: | | t. ombre | t. ombre | Concurrence de la végét.: | faible | faible | faible | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Caractéristique recrû: | Hê (rec.) | Hê (raj.) | Ep (raj.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Degré de fermeture: | e | e | e | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hauteur dominante: | 0.1 | 0.7 | 0.7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pousse terminale: | | t. ombre | t. ombre | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Concurrence de la végét.: | faible | faible | faible | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Remarque: Rendzine calcaire | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dégâts: | | Partie inférieure du sol: | | Volume sur pied, accroissement, produits d'éclaircie: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aucun dégâts de gibier, car suffisamment de nourriture dans les pâturages voisins | | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Résineux</th> <th colspan="2">Feuillus</th> <th colspan="2">Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tiges</td> <td>22</td> <td>Tiges</td> <td>128</td> <td>Tiges</td> <td>150</td> </tr> <tr> <td>SV</td> <td>37.2</td> <td>SV</td> <td>78.6</td> <td>SV</td> <td>115.8</td> </tr> <tr> <td>Tige/moy.</td> <td>1.69</td> <td>Tige/moy.</td> <td>0.61</td> <td>Tige/moy.</td> <td>0.77</td> </tr> <tr> <td>Tiges/ha</td> <td>88</td> <td>Tiges/ha</td> <td>512</td> <td>Tiges/ha</td> <td>600</td> </tr> <tr> <td>Vol./ha</td> <td>149</td> <td>Vol./ha</td> <td>314</td> <td>Vol./ha</td> <td>463</td> </tr> </tbody> </table> | | Résineux | | Feuillus | | Total | | Tiges | 22 | Tiges | 128 | Tiges | 150 | SV | 37.2 | SV | 78.6 | SV | 115.8 | Tige/moy. | 1.69 | Tige/moy. | 0.61 | Tige/moy. | 0.77 | Tiges/ha | 88 | Tiges/ha | 512 | Tiges/ha | 600 | Vol./ha | 149 | Vol./ha | 314 | Vol./ha | 463 |
| Résineux | | Feuillus | | Total | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tiges | 22 | Tiges | 128 | Tiges | 150 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SV | 37.2 | SV | 78.6 | SV | 115.8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tige/moy. | 1.69 | Tige/moy. | 0.61 | Tige/moy. | 0.77 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tiges/ha | 88 | Tiges/ha | 512 | Tiges/ha | 600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vol./ha | 149 | Vol./ha | 314 | Vol./ha | 463 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Stade de développement / type de structure: SD4 dans le hêtre et SD4 et 5 dans l'épicéa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |